




NeoTell



1




2



3



4



6



5



7






NeoTell



## WISSENSCHAFTLICHE NACHWEISE

1. Sennarby L. Implantologie 2013;21(1):21–33
2. Kokovic V, Jung R, Feloutzis A, Todorovic V, Jurusic M, 2. Hämmерle C. Clinical Oral Implants Research, 00, 2013, 1–6
3. Bonstein M, Hart C, Habritter S, Morton D, Buser D. Clin Implant Dent Relat Res 2009
4. Serge Baltayan, Joan Pi-Anfuns, Tara Aghaloo, Peter Moy. J Oral Maxillofac Surg 74:1145–1152, 2016
5. Östman P-O. Clinical Implant Dentistry and Related. Research, Volume 7, Supplement 1, 2005
6. Rodrigo D, Aracil L, Martin C, Sanz M. Clin. Oral Impl. Res. 21, 2010; 255–261
7. Pagliani L, Sennarby L, Petersson A, Verrochi D, Volpe S & Andersson P. Journal of Oral Rehabilitation 2012
8. Trisi P, Carlesi T, Colagiovanni M, Perfetti G. Journal of Osteology and Biomaterials, Volume 1, Number 3, 2010
9. Stefan Paul Hicklin, Esther Schneebeli, Vivianne Chappuis, Simone Francesco Marco Janner, Daniel Buser, Urs Brägger. Clin. Oral Impl. Res 00, 2015; 1–9



Obenstehend ist eine Zusammenfassung wissenschaftlicher Daten und keine offizielle Empfehlung von Neoss. Zur Überwachung der Osseointegration messen Sie bei der Platzierung und vor der endgültigen Restauration.

15604\_0 DE 23-04 © Neoss Group, 2023. Urheberrechte, Designrechte und Marken, Neoss-Dokumente, -Software und -Designs dürfen ohne die schriftliche Genehmigung der Neoss Group weder ganz noch teilweise nachgedruckt, kopiert oder veröffentlicht werden. Neoss, das N-Logo und NeoTell™ sind Marken der Neoss Group.